

F

C

98,0	36,7
98,2	36,8
98,4	36,9
98,6	37,0
98,8	37,1
99,0	37,2
99,2	37,3
99,4	37,4
99,6	37,5
99,8	37,7
100,0	37,8
100,2	37,9
100,4	38,0
100,6	38,1
100,8	38,2
101,0	38,3
101,2	38,4
101,4	38,5
101,6	38,7
101,8	38,8
102,0	38,9
102,2	39,0
102,4	39,1
102,6	39,2
102,8	39,3
103,0	39,4
103,2	39,5
103,4	39,7
103,6	39,8
103,8	39,9
104,0	40,0
104,2	40,1
104,4	40,2
104,6	40,3
104,8	40,4
105,0	40,5

Tableau de conversion des températures

MÉTHODE UTILISÉE

PLACE DE TEMPÉRATURE NORMALE

Rectale	36,6° C à 38,0° C (97,9° F à 100,4° F)
Tympanique	35,8° C à 38,0° C (96,4° F à 100,4° F)
Buccale	35,5° C à 37,5° C (95,9° F à 99,5° F)
Axillaire	34,7° C à 37,3° C (94,5° F à 99,1° F)



SOMMAIRE DES TECHNIQUES RECOMMANDÉES POUR MESURER LA TEMPÉRATURE

Âge	Techniques recommandées
De la naissance à 2 ans	1. Rectale (<i>indiquée</i>) 2. Axillaire (<i>dépistage des enfants peu vulnérables</i>)
De 2 à 5 ans	1. Rectale (<i>indiquée</i>) 2. Axillaire, tympanique
Plus de 5 ans	1. Orale (<i>définitive</i>) 2. Axillaire tympanique